

# 栽培のしおり

## 【カラシ菜(アブラナ科)】

### 栽培時期

8月ごろ

### 栽培のポイント

### 品 種

三池高菜 さがみグリーン

### 土壌酸性度

### 連作障害

有(1~2年)

### 元 肥(1米当たり)

2週間前に苦土石灰100g、一週間前に、堆肥 3kg 化成肥料 100g

### 種まき・間引き

幅1cm、深さ2cmのまき溝にタネをまいて約5cmの土をかぶせる。

発芽したら込み合っているところを2回間引きし、本葉5~6枚のときに株間が15cm間隔になるように間引く。

間引き後にチッソ分の多い肥料を施す。1回目の間引き後は株間に、2回目の間引き後は畝の肩に施す。

### 発芽日数

### 追 肥(1米当たり)

### 収 穫

草丈が10~15cmになれば収穫する。

### 栽培実績

#### 品 種(xxxxxxxx)

2009土作り(D-4区画)

10/XX 種蒔

11/11 移植

#### 品 種(xxxxxxxx)

2009土作り(A-3区画)

11/27 化成肥料、堆肥

11/28 マルチ、種蒔、トンネル掛け

12/10 発芽

02/08 発育不良、撤去

#### 品 種(xxxxxxxx)

2009土作り(G1~3区画)

12/10 PH6.7

12/14 化成肥料、堆肥

01/08 マルチ、種蒔、穴あきトンネル掛け

01/15 敷藁

01/17 発芽

01/25 穴なしトンネルに掛け替え

02/09 間引き

02/21 間引き

02/25 穴なし→穴ありトンネルに掛け替え

03/03 間引き、追肥

03/14 穴ありトンネル撤去

04/18 収穫完